



## Abstracts

**Ein Vergleich der Konsummuster von Methamphetamin (MA) und Kokain**

*Simon SL, Richardson K, Dacey J, Glynn S, Domier CP, Rawson RA, Ling W*

Original: A comparison of patterns of methamphetamine and cocaine use (J Addict Dis. 2002; 21(1): 35-44)<sup>1</sup>

Unter Anwendung von Messungen zu Selbstbeurteilungen von 120 MA- und 63 Kokainkonsumenten wurden die typischen Muster des MA-Konsums untersucht. 20 Probanden (14 MA und 6 Kokain) nahmen auch an strukturierten Interviews teil, die designiert waren, um spezifischere Beschreibungen ihres Drogenkonsums zu ermöglichen. Der typische MA-Gebraucher konsumiert über 20 Tage pro Monat. Sein Konsum ist gleichmäßig über den Tag hinweg verteilt und, obwohl die Menge der Droge pro Tag sich nicht unterscheidet, konsumieren MA-Gebraucher seltener am Tag, als es Kokainkonsumenten tun. Von den Kokainkonsumenten sind nur wenige andauernd konsumierend und sie konsumieren eher abends als tagsüber. Das Muster bei Kokain mit weniger Konsumtagen, einem Konsum am Abend und der stetigeren Dosen pro Tag passt in das Bild eines Gelegenheitskonsums, während dies das Muster eines Methamphetaminkonsums mit Einnahme an den meisten Tagen fast den ganzen Tag lang nicht tut.

<sup>1</sup> Copyright © 2015 Taylor & Francis LLC. Übersetzung und Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von Taylor & Francis LLC. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.