



Abstracts

**Lebenslanger Substanzkonsum und das sexuelle Risikoverhalten
bzgl. HIV sind Prädiktoren dafür, wie obdachlose substanz-abhängige
MSM auf eine Behandlung mittels Kontingenzmanagement
ansprechen werden**

Reback CJ, Peck JA, Fletcher JB, Nuno M, Dierst-Davies R

Original: Lifetime substance use and HIV sexual risk behaviors predict treatment response to contingency management among homeless, substance-dependent MSM (J Psychoactive Drugs. 2012; 44 (2): 166-172)¹

Obdachlose, substanz-abhängige Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), leiden weiterhin an einer gesundheitlichen Ungleichheit einschließlich hoher Raten an HIV. 131 obdachlose, substanz-abhängige MSM wurden zufällig der Intervention eines Kontingenzmanagements (CM) zugewiesen, um die Abstinenz von Substanzen und gesundheitsförderliche Verhaltensweisen zu erhöhen. Die Teilnehmer wurden aus einem auf der Gruppe gestützten Gesundheitsbildungs-/ Risiko-Präventionsprogramm zur HIV-Prävention rekrutiert und die Forschungsaktivitäten wurden auch an der Studienstätte in der Gruppe durchgeführt. Sekundäranalysen wurden durchgeführt, um die Personen, die auf eine Behandlung ansprechen, zu identifizieren und zu charakterisieren (in einer Intervention des Kontingenzmanagements als diejenigen Teilnehmer definiert, die in drei primären Ergebnissen auf dem oder über dem Median punkteten). Personen, die auf eine Behandlung ansprechen, waren eher kaukasisch/weiß ($p < 0.05$), berichteten von mehreren Jahren ihres Lebens mit einem Methamphetamin-, Kokain- und multiplen Substanzkonsum ($p \leq 0.05$) und berichteten von mehr Sexualpartnern und hoch-risikoreichen, sexuellen Verhaltensweisen in letzter Zeit als die Personen, die nicht auf eine Behandlung ansprachen ($p < 0.05$). Die Anwendung evidenz-basierter Interventionen bleibt weiterhin von Priorität im öffentlichen Gesundheitswesen, insbesondere im Bemühen, effektive Interventionen bzgl. eines Konsums in Gruppensettings mit aufzunehmen. Die Identifikation sowohl von Personen, die auf eine Behandlung ansprechen, als auch derjenigen, die es nicht tun, ist für die Entwicklung einer maßgeschneiderten Intervention für spezifische Populationen sowohl in Unterstützungsprogrammen als auch in Forschungsstudien von Bedeutung, um die Ergebnisse unter hoch betroffenen Populationen zu optimieren.

¹ Copyright © 2015 Taylor & Francis LLC. Übersetzung und Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von Taylor & Francis LLC. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.