



## Abstracts

**Klinischer Verlauf und Ergebnisse bei methamphetaminabhängigen Erwachsenen mit einer Psychose**

*Glasner-Edwards S, Mooney LJ, Marinelli-Casey P, Hillhouse M, Ang A, Rawson R, Methamphetamine Treatment Project Corporate Authors*

Original: Clinical course and outcomes of methamphetamine-dependent adults with psychosis (Journal of Substance Abuse Treatment 2008; 35: 445-450)<sup>1</sup>

Nur wenig ist über den Zusammenhang zwischen Psychosen und Behandlungsergebnissen bei Konsumenten von Methamphetamin (MA) bekannt. Anhand der Daten von 526 Erwachsenen in der bis dato größten psychosozialen, klinischen Studie mit MA-Konsumenten, untersuchte diese Studie psychiatrische Folgen, Substanzkonsum und funktionelle Ergebnisse bei MA-Konsumenten mit einhergehender Psychose drei Jahre nach der Behandlung. Das Vorliegen einer psychotischen Störung ging im Laufe der Zeit mit gesteigener Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten und höherem Niveau psychiatrischer Symptomatik in mehreren Bereichen einher. MA-Konsumenten mit gleichzeitig auftretender Psychose können deshalb von frühen psychosozialen und/oder pharmakologischen Interventionen zur Behandlung der psychiatrischen Symptome profitieren.

<sup>1</sup> Copyright © 2008 Elsevier. Übersetzung und Wiedergabe mit Genehmigung von Elsevier. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.