



Abstracts

Inanspruchnahme einer Behandlung und Hindernisse für eine Behandlung: Ergebnisse einer Umfrage an abhängigen Methamphetaminkonsumenten

Kenny P, Harney A, Lee NK, Pennay A

Original: Treatment utilization and barriers to treatment: Results of a survey of dependent methamphetamine users (Substance Abuse Treatment Prevention and Policy 2011; 6: 3)¹

Hintergrund: Australien hat weltweit eine der höchsten Methamphetaminkonsumraten, dennoch ist der Behandlungszugang für Methamphetamin vergleichsweise gering. Diese deskriptive Studie zielte auf die Identifizierung von Mustern der Inanspruchnahme von Behandlungen und auf wahrgenommene Hindernisse des Zugangs zu Behandlungen unter abhängigen Methamphetaminkonsumenten, in der Hoffnung, dass diese Informationen die Dienste dazu befähigen werden, auf diese Gruppe geeigneter einzugehen.

Methodik: 126 Methamphetaminkonsumenten, die eine gegenwärtige oder vergangene Methamphetaminabhängigkeit hatten, wurden über ihre Erfahrungen mit einer und den wahrgenommenen Hindernissen für eine Behandlung interviewt.

Ergebnisse: Die Inanspruchnahme einer Behandlung unter Methamphetaminkonsumenten war wie berichtet gering. Eine der genannten Hauptgründe für die Nichtinanspruchnahme einer Behandlung war, dass Methamphetaminkonsumenten ihren Drogenkonsum nicht als Problem wahrgenommen haben (abgesehen offensichtlicher Abhängigkeitsebenen). Selbstentgiftung mit legalen und illegalen Drogen war in dieser Gruppe hoch. Die Teilnehmer erkannten einen Mangel an Vertrauen in die Fähigkeit der Behandlungsdienste, Methamphetaminabhängigkeit anzugehen und die auf Opiate ausgerichtete Natur der Behandlungsdienste als signifikantes Hindernis für eine Behandlungsaufnahme. Vorschläge zur Verbesserung durch die Teilnehmer umfassten spezialisierte Dienstleistungen für Methamphetaminkonsumenten mit dem Schwerpunkt auf Reagibilität und routinemäßiges Fallmanagement in dieser Gruppe.

Diskussion und Schlussfolgerungen: Um die Versorgung zu verbessern, sollten Behandlungsdienste ihre Angebote durch kleine Veränderungen neuorientieren, um besser die Bedürfnisse von Methamphetaminkonsumenten anzugehen, wie z. B. spezifische Öffnungszeiten für

¹ Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons CC BY 2.0-Lizenz. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.

Methamphetaminkonsumenten oder zweckdienliche Räumlichkeiten zur Meth-amphetamin-behandlung. Alternative Optionen, wie z. B. Onlinebehandlungen und spezialisierte Meth-amphetaminkliniken, sollten für Methamphetaminkonsumenten in Betracht gezogen werden.

