



## Abstracts

**Todesfälle von Föten und Säuglingen, die mit einem mütterlichen  
Abusus von Methamphetamin assoziiert werden**

*Stewart JL, Meeker JE*

Original: Fetal and infant deaths associated with maternal methamphetamine abuse (J Anal Toxicol. 1997; 21 (6): 515-517)<sup>1</sup>

Acht Todesfälle von Föten und Säuglingen, die in Bezug zu einem mütterlichen Abusus von Methamphetamin stehen, werden dargestellt. Die mittlere fetale MA-Blutkonzentration betrug 0,36 µg/ml (Breite: 0.03-1.20 µg/ml) und die mittlere Amphetaminkonzentration betrug 0,05 µg/ml (Breite; 0-0.08 µg/ml). Sowohl die mütterliche als auch die fetale Blut-Methamphetamin-Konzentration wurde in zwei Fällen festgestellt. In diesen beiden Fällen betrug die mütterliche und die fetale Methamphetaminkonzentration 0.21 µg/ml und 0.40 µg/ml und 0.18 µg/ml und 1.20 µg/ml, respektive. Die Todesursache in allen Fällen wird, so wie vom Pathologen bescheinigt, noch besprochen.

<sup>1</sup> Copyright © 2015 Oxford University Press. Übersetzung und Wiedergabe mit Genehmigung von Oxford University Press. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.