



Abstracts

Rückgang der Behandlungseinweisungen Jugendlicher wegen Methamphetaminkonsum in Kapstadt

Pluddemann A, Dada S, Parry C

Original: Decline in adolescent treatment admissions for methamphetamine use in Cape Town (South African Medical Journal (SAMJ 2013; 103 (7): 478-480)¹

Hintergrund und Ziele: Der Zweck dieses Berichts besteht in der Beschreibung der sich ändernden Trends bei Behandlungsaufnahmen jugendlicher Methamphetaminkonsumenten und in der Diskussion möglicher Schlussfolgerungen.

Methodik: Im Rahmen der *South African Community Epidemiology Network on Drug Use* (SACENDU) wurden alle 6 Monate Daten bzgl. der Aufnahme einer Drogenmissbrauchsbehandlung über ein reguläres Beobachtungssystem innerhalb von Drogenbehandlungszentren und -programmen gesammelt. Ein einseitiges Formular wurde vom Personal des Behandlungszentrums für jeden Patienten ausgefüllt, um Daten zur Demografie und zum Substanzmissbrauch zu erfassen.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass zwischen 2004 und 2006 eine signifikante Zunahme im Anteil der Behandlungsaufnahmen von Jugendlichen wegen eines Methamphetaminmissbrauchs auftraten, während zwischen 2006 und 2011 eine signifikante Abnahme auftrat.

Schlussfolgerungen: Der anfängliche Anstieg der Behandlungsaufnahmen Jugendlicher wegen eines Missbrauchs von Methamphetamin von 2004 bis 2006 und die folgende Abnahme zwischen 2006 und 2011 könnten eine Veränderung in den Mustern des Methamphetaminmissbrauchs unter Erwachsenen in Kapstadt andeuten.

¹ Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution NonCommercial Works License (CC BY-NC 3.0). Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.