



Abstracts

Psychiatrische Komorbidität, Abhängigkeitserkrankungen, sexuell übertragbare Krankheiten und risikoreiche Verhaltensweisen unter Methamphetamin (MA)-abhängigen schwulen und bisexuellen Männern, die eine ambulante Suchtbehandlung aufgesucht haben

Shoptaw S, Peck J, Reback CJ, Rotheram-Fuller E

Original: Psychiatric and substance dependence comorbidities, sexually transmitted diseases, and risk behaviors among methamphetamine-dependent gay and bisexual men seeking outpatient drug abuse treatment (J Psychoactive Drugs. 2003; 35 (1): 161-168)¹

Dieser Artikel beschreibt die psychiatrische Komorbidität und die einer Substanzabhängigkeit, die lebenslangen Raten von Infektionskrankheiten und die hoch-risikoreichen sexuellen Verhaltensweisen bei MA-abhängigen schwulen und bisexuellen Männern, die eine Suchtbehandlung wegen ihres Drogenmissbrauchs in Los Angeles begonnen haben. Die Eigenberichte zu hoch-risikoreichen sexuellen Verhaltensweisen und Drogenkonsum sowie der Vorgeschichte des Status der Infektionskrankheiten wurden für das DSM-IV (SCID) zu diagnostischen Informationen aus 155 strukturierten, klinischen Interviews korreliert. Insgesamt 82 Teilnehmer erfüllten die Kriterien für eine lebenslange depressive Störung; 44 Teilnehmer erfüllten die Kriterien für eine lebenslange Angststörung. Im Vergleich zu denen ohne eine psychiatrische Diagnose wurden in der lebenslangen Prävalenz sexuell übertragbarer Erkrankungen unter denen mit einer allgemeinen Angststörung (höhere Raten oder Genitalgonorrhö), spezifischen Phobien und einer hauptsächlich depressiven Störung (höhere Raten oder Oralgonorrhö), einer Sozialphobie (höhere Raten oder Syphilis) und einer bipolaren Störung vom Typ 1 (höhere Raten oder HIV) signifikante Unterschiede wahrgenommen. Unterschiede in der Prävalenz infektiöser Erkrankungen korrespondierten nicht mit signifikant anderen Raten hoch-risikoreicher sexueller Verhaltensweisen. Die Befunde zeigen an, dass schwule und bisexuelle Männer, die wegen einer Methamphetaminabhängigkeit eine Behandlung aufsuchen, dazu neigen, eine psychiatrische Komorbidität aufzuweisen und hohe Raten infektiöser Krankheiten zu haben, einschließlich HIV, Syphilis und Gonorrhö.

¹ Copyright © 2015 Taylor & Francis LLC. Übersetzung und Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung von Taylor & Francis LLC. Keine Gewähr für die Richtigkeit von Quellenangabe und Übersetzung.